Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

CPS Locarno
Via alla Morettina 3
6600 Locarno
decs-cps.locarno@edu.ti.ch

Ai candidati ammessi
alle formazioni TAB e TRM

Gentile signora,

Gentile signore,

a seguito dell'ammissione alla scuola sopracitata, dovrà svolgere una visita d'entrata (*art. 9 della Legge sulle scuole professionali* – 2 ottobre 1996) con annesso il controllo dello stato vaccinale ed eventuale decisione di completamento del ciclo (*Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie del Cantone Ticino in cui vengono erogate prestazioni a pazienti degenti* – 8 aprile 2019) . Verrà pertanto convocata/o dal medico di fiducia della scuola. In questa sede dovrà portare con sé il suo libretto delle vaccinazioni già effettuate.

Cordialmente

CPS Locarno

Direttrice – Manuela del Torso

UCSS - Unità di coordinamento stage sociosanitari

Capo settore – Daniela Dus

Direttive vaccinali

per i candidati ammessi ad una formazione sanitaria

La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica d'entrata. Per quanto attiene alle vaccinazioni si fa riferimento alle disposizioni dei luoghi di stage, le quali sono vincolanti per la persona in formazione.

Le indicazioni che seguono sono tratte dal Calendario vaccinale svizzero (Ufficio federale della sanità pubblica e Commissione federale per le vaccinazioni) che prevede indicazioni specifiche per il personale sanitario. L'Ufficio del medico cantonale raccomanda che ogni persona attiva in ambito sanitario sia vaccinata in conformità alle indicazioni del Calendario vaccinale svizzero.

Epatite B (HBV)

- Controllare lo status vaccinale e seguire l'algoritmo qui sotto (tratto dal Calendario vaccinale svizzero):

Figura
Algoritmo della vaccinazione contro l'epatite B nel personale sanitario



anti-HBsAc = sierologia per anticorpi anti HBs, HBsAg = sierologia per antigene HBs.
*Se, dopo 6 dosi in totale, gli Ac anti-HBs restano inferiori a 100 U/l, l'indicazione a somministrare delle dosi supplementari è da discutere caso per caso.

Morbillo, Orecchioni, Rosolia (MOR)

- Controllare lo status vaccinale.
- Se la vaccinazione MOR in due dosi non è documentata nel certificato di vaccinazione, procedere alla somministrazione di due dosi o, in presenza di una sola dose, alla somministrazione della dose mancante.
- In alternativa, misurare gli anticorpi contro morbillo, orecchioni e rosolia e, in caso di sierologia negativa, procedere alla somministrazione di due dosi.

Varicella

- Valutare tramite anamnesi una pregressa varicella.
- In caso di anamnesi incerta effettuare una sierologia per varicella (IgG).
- In caso di anamnesi negativa o di anamnesi incerta e sierologia negativa procedere con la somministrazione di due dosi.

Difterite, Tetano, Pertosse

- Controllare lo status vaccinale.
- Eseguire la vaccinazione di base qualora non sia stata effettuata.
- Eseguire le dosi di richiamo contro difterite-tetano e pertosse conformemente a quanto previsto dal calendario vaccinale.
- Secondo le raccomandazioni dell'UFSP, gli allievi di qualsiasi età, in contatto regolare con dei lattanti di meno di 6 mesi dovrebbero ricevere una dose di dTpa a intervalli di 10 anni. Essendo impossibile prevedere i luoghi di stage la vaccinazione anche per la pertosse è indicata per tutti gli allievi.

Poliomielite

- Verificare l'avvenuta vaccinazione di base e in sua assenza procedere con la vaccinazione secondo il Calendario vaccinale.

Tubercolosi (test IGRA)

- Eseguire il test IGRA secondo le direttive della Lega polmonare svizzera e se positivo iniziare le procedure di accertamento.