

Via Vergiò 18
Casella postale 367
091 815 31 00
091 815 31 09
decs-dfp@ti.ch



**Divisione della formazione professionale
6932 Breganzona**

telefono
fax
e-mail

Funzionario
incaricato

Daniela Dus

telefono
e-mail

091 / 815 30 92
daniela.dus@ti.ch

**A tutti i candidati
di una formazione
sanitaria e sociale**

Breganzona



Ns. riferimento

Vs. riferimento

DD

Gentile signora,

Egregio signore,

al fine di completare la procedura d'ammissione, lei deve verificare, come da direttive allegata, se la situazione vaccinale è conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute per il personale sociosanitario (art. 9 della Legge sulle scuole professionali – 2 ottobre 1996 e Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie – 8 aprile 2019).

Le chiediamo, pertanto, di far compilare al suo medico di famiglia la "Cartella sanitaria d'entrata per il controllo dello stato vaccinale", attenendosi alle direttive poste in allegato.

All'atto dell'ammissione dovrà poi consegnare alla segreteria della scuola:

1. La "Cartella sanitaria d'entrata per il controllo dello stato vaccinale" attestante tutte le vaccinazioni previste e controfirmata dal suo medico di famiglia,
2. La fotocopia del libretto delle vaccinazioni aggiornato.

I dati da lei forniti saranno inseriti nella banca dati GAGI (art. 91° della Legge della scuola) e trattati secondo le disposizioni del titolo IV del Regolamento della Legge della scuola a tutela e salvaguardia delle norme della privacy.

Cordialmente.

UCSS - Unità di coordinamento stage sociosanitari

Capo settore

Dus Daniela

Direttive vaccinali

e

adempienze da effettuare per i candidati all'ammissione ad una formazione sanitaria

Nell'ambito delle procedure di controllo dello stato di salute che consentono l'accesso alle formazioni sociosanitarie, tramite il Medico di famiglia dovrà essere certificata l'idoneità dello stato vaccinale per rapporto ai criteri sotto indicati.

Lo studente che non risponde ai criteri indicati, durante la formazione non potrà essere inviato in determinate realtà di stage. Risultano pertanto obbligatori gli adempimenti vaccinali richiesti durante la formazione in ambito sociosanitario: in caso contrario, vi sarà l'impossibilità di svolgere stage in alcuni ambiti specifici.


Le disposizioni che seguono, seguono le direttive del Calendario vaccinale svizzero emanato dall'UFSP e sono state approvate dall'Ufficio del Medico Cantonale.

Epatite B (HBV)

- Seguire l'algoritmo qui sotto (tratto dal Calendario vaccinale svizzero 2019):

Figura

Algoritmo della vaccinazione contro l'epatite B nel personale sanitario



anti-HBsAc = sierologia per anticorpi anti HBs, HBsAg = sierologia per antigene HBs.

*Se, dopo 6 dosi in totale, gli Ac anti-HBs restano inferiori a 100 U/l, l'indicazione a somministrare delle dosi supplementari è da discutere caso per caso.

Quantiferon test (TBC)

- Eseguire il test e se positivo iniziare le procedure di accertamento.

Morbillo, Orecchioni, Rosolia

- Controllo status vaccinale.
- Se la vaccinazione MOR (Priorix®) in due dosi non è dimostrata tramite certificato vaccinale, procedere alle due vaccinazioni con Priorix®.
- In alternativa, misurare gli anticorpi contro morbillo, parotite (orecchioni) e rosolia e procedere alla vaccinazione MOR in caso di sierologia negativa.

Varicella

- Verificare l'anamnesi per pregressa varicella
- Effettuare una sierologia per varicella (IgG) in caso di anamnesi negativa o incerta
- Vaccinazione (2 dosi) in caso di anamnesi negativa e sierologia negativa

Poliomielite

- Controllo status vaccinale.
- Raccomandata la vaccinazione di base.
- Recupero da effettuare unicamente simultaneamente all'eventuale rinnovo dell'immunizzazione contro la difterite, il tetano e la pertosse con un vaccino dT(pa)-IPV.

Difterite, Tetano e Pertosse

- Controllo status vaccinale.
- Eseguire la vaccinazione di base qualora l'allievo non l'abbia effettuata.
- Secondo le raccomandazioni dell'UFSP, gli allievi di qualsiasi età, in contatto regolare con dei lattanti di meno di 6 mesi dovrebbero ricevere una dose di dTpa a intervalli di 10 anni. Essendo impossibile prevedere i luoghi di stage la vaccinazione anche per la pertosse è da eseguire per tutti gli allievi.
- Se l'allievo ha ricevuto la vaccinazione di base difterite e tetano, ma non contro la pertosse, è indicata una dose di vaccino dTpa: in questa situazione, l'intervallo minimo dall'ultima dose di vaccino antitetanico è soltanto di 4 settimane.

Cartellasanitariad'entrata - Controllo stato vaccinale

Cognome enome: _____ Data dinascita: _____

PATOLOGIA	MALATTIA EFFETTUATA SI/NO	DOVE PREVISTO ESEGUIRE E RIPORTARE RISULTATI ANTICORPI (Per Epatite B riportare il titolo)		VACCINAZIONE								
				Data vaccinazione 1	Data vaccinazione 2	Data vaccinazione 3	Data vaccinazione 4	Data vaccinazione 5	Titolo anticorpale post vaccinazione	Data richiamo	Titolo anticorpale post richiamo	
EPATITE B		SE NO e già vaccinato: Titolo =>										
TBC (Quantiferone)			SE TEST QUANTIFERONE È POSITIVO => PROCEDERE AD ACCERTAMENTI CLINICI									
MORBILLO		Se no o dati sconosciuti, fare sierologia e se negativa =>										
PAROTITE		Se no o dati sconosciuti, fare sierologia e se negativa =>										
ROSOLIA		Se no o dati sconosciuti, fare sierologia e se negativa =>										
VARICELLA			SE NEG=>									
POLIO												
PERTOSSE				Richiamo ogni 10 anni (Vaccino dTp _a)								
DIFTERITE				Per persone fino a 25 anni una dose di richiamo ogni 10 anni.								
TETANO				Per persone tra 25 e 65 anni una dose di richiamo ogni 20 anni								
COVID - 19												

Luogo e data

Timbro e firma del Medico di famiglia

Luogo e data

Timbro e firma del Medico scolastico
